

# CONCILIACIÓN DE MEDICACIÓN EN CENTROS SOCIO SANITARIOS

Conferencia Europea de Seguridad del Paciente

Implementación de prácticas seguras en el marco de la acción colaborativa PaSQ



Eugenio Vera Salmerón

Madrid 21 de octubre de 2016

# Estado actual

- El 50% de los errores de medicación (EM) están relacionados con *transiciones asistenciales* o con los cambios en el responsable médico del paciente.
- Se suelen deber al *desconocimiento*, total o parcial, del tratamiento actual de los pacientes.
- Se produce por una falta de comunicación entre los distintos niveles asistenciales, motivada en gran parte por la *ausencia de Sistemas de Información comunes*

# CONCEPTOS:

## •CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN (CM):

Proceso formal y protocolizado de **comparación** y **resolución** de las posibles **discrepancias** entre la **medicación** que el enfermo tomaba **antes** de una **transición asistencial** y la **nueva medicación** prescrita durante ese proceso asistencial.

## •ERROR DE CONCILIACIÓN:

Toda **discrepancia no justificada** entre el tratamiento previo y el posterior que es **modificada por el médico**.

# OBJETIVOS

- General:
  - Detectar y corregir los errores de medicación relacionados con la transición de los pacientes entre niveles asistenciales.
- Específicos:
  - Asegurar que los pacientes reciben los medicamentos necesarios.
  - Asegurar que los medicamentos están prescritos con la dosis, vía y frecuencia correctas.
  - Asegurar que son los adecuados a la nueva prescripción.

## UNIDAD DE ATENCION A RESIDENCIAS

1 RESPONSABLE (E. G. C)

2 MÉDICOS

2 AUX. ADMINISTRATIVOS

## POBLACIÓN DE ESTUDIO

5.000 Residentes


Edad Media :82.5 años

72 Residencias


## MUESTREO SISTEMÁTICO(1 año)

112 Ingresos o Altas hospitalarias  
de 4 Residencias


## Intervención al ingreso o alta hospitalaria:




## Pacientes conciliados 112




# Medicamentos Evaluados 1144



## Pacientes con errores de conciliación



# GRUPOS TERAPEÚTICOS CON MAYOR N° DE DISCREPANCIAS





# Conclusiones

El 90% de los pacientes estudiados han tenido al menos un error de medicación.

La implantación de un protocolo de conciliación reduce estos errores prácticamente a CERO.